



العلامات التحذيرية للجلطة الدماغية



إخدرار أو ضعف مفاجيء في الوجه أو الذراع أو الرجل وخاصة إذا كان في جهة واحدة من الجسم



ارتباك أو تشويش مفاجيء مع صعوبة في النطق أو الإستيعاب



إنخفاض او صعوبة مفاجئة في الرؤية في إحدى العينين أو كليهما معاً



صداع شديد مفاجيء من غير سبب معروف



صعوبة مفاجئة في المشي ودوخان وعدم الإتزان والتناسق

إتصل فوراً [بالإسعاف ١٠١] (من الأفضل أن تكون مجهزة للعناية المركزة)

الإنتباه للوقت لمعرفة بداية ظهور أول العلامات لإن المباشرة الفورية بعلاج المريض في أول ثلاث ساعات من ظهور الأعراض وإعطائه دواء مذيبياً للتجلط ويدعى (بلازمينوجن أكتيفيتر) أو (TPA) يمكن أن يخفض من العجز عند المريض في المدى البعيد في أغلبية أنواع الجلطات الدماغية. إن دواء ال (TPA) هو الوحيد المعترف به من منظمة الأدوية والغذاء في علاج الجلطات الدماغية في أول ثلاث ساعات من حدوثها.

إن الجلطات الدماغية الصغيرة العابرة (TIA) هي عبارة عن جلطات دماغية صغيرة تحذيرية، وتسبب نفس الأعراض للجلطات الدماغية الكبيرة ولكن من غير إحداث تلف في الدماغ. لذلك فإن التعرف على وعلاج هذه الجلطات التحذيرية الصغيرة يمكن الوقاية من احتمالات الإصابة بالجلطات الدماغية الحادة. والفرق الوحيد بين الجلطات التحذيرية والجلطات الدماغية الحادة أنها تكون مؤقتة ولا تسبب تلف في الدماغ.